



\_\_\_\_\_을(를) 위해 \_\_\_\_\_

## kcal/oz 를 준비하는 방법

### 분유 계량 스푼 사용

How to prepare \_\_\_\_\_ kcal/oz for \_\_\_\_\_  
Using scoops (Korean)

#### 설명서: Instructions:

1. 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 양의 물을 측정하십시오.

Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.

2. 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오. 분유 통에 있는 전용 분유 계량 스푼만 사용하십시오.

Add listed amount of formula scoops. Use only the scoop provided in the formula container.

3. 잘 저어주십시오. Stir well.

4. 분유를 완전히 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에 사용하십시오.

Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

물의 양 Amount of Water		분유 스푼 수 (스푼에 꼭꼭 누르지 말고 수북히 담아서 수평이 되도록 깎아서 계량) Scoops of formula (unpacked and level scoops)		만들어진 분유의 대략 온스 Approximate Ounces Made
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 분유를 데울 때 전자레인지 사용하지 마십시오. 대신 우유병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나, 우유병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 분유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 우유병에 남아 있는 분유는 수유 후 2시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

- 반 스푼 계량은 하지 마십시오.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화 번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스

Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원(University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니니다.

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by University of Michigan Health is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.

을(를) 위해

\_\_\_\_\_ kcal/oz 를 준비하는 방법  
분유 계량 스푼 사용  
How to prepare \_\_\_ kcal/oz for \_\_\_\_\_  
Using scoops (Korean)

설명서: Instructions:

1. 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 양의 물을 측정하십시오.

Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.

2. 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오. 분유 통에 있는 전용 분유 계량 스푼만 사용하십시오.

Add listed amount of formula scoops. Use only the scoop provided in the formula container.

3. 잘 저어 주십시오. Stir well.

4. 분유를 완전히 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에 사용하십시오.

Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

물의 양 Amount of Water		분유 스푼 수 (스푼에 꼭꼭 눌러서 담아 수평이 되도록 깎아서 계량) Scoops of formula (packed and level scoops)		만들어진 분유의 대략 온스 Approximate Ounces Made
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+		=	___ 온스 ounces

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 분유를 데울 때 전자레인지 사용을 하지 마십시오. 대신 우유병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나, 우유병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 분유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 우유병에 남아 있는 분유는 수유 후 2시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

- 반 스푼 계량은 하지 마십시오. Do not use half scoops.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스 Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원(University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by [University of Michigan Health](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.



\_\_\_\_\_을(를)

위해 \_\_\_\_\_ kcal/oz 를 준비하는 방법

가정 계량 용품 사용

How to prepare \_\_\_ kcal/oz for \_\_\_\_\_

Using household measurements (Korean)

**설명서: Instructions:**

1. 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 양의 물을 측정하십시오.  
Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
2. 계량컵/스푼을 사용하여 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오. Add listed amount of formula using measuring cups/spoons.
3. 잘 저어주십시오. Stir well.
4. 분유를 완전히 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에 사용하십시오. Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

물의 양 Amount of Water		분유의 양 (스푼에 꼭꼭 누르지 말고 수북히 담아서수평이 되도록 깎아서 계량) Amount of Formula (unpacked and level measurements)		만들어진 분유의 대략 온스 Approximate Ounces Made
___ 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 분유를 데울 때 전자레인지 사용을 하지 마십시오. 대신 우유병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나, 우유병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 분유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 우유병에 남아 있는 분유는 수유 후 2 시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스

Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니다.

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by [University of Michigan Health](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.



\_\_\_\_\_을(를) 위해

\_\_\_\_\_ kcal/oz 를 준비하는 방법

가정 계량 용품 사용

How to prepare \_\_\_ kcal/oz for \_\_\_\_\_  
Using household measurements (Korean)

**설명서: Instructions:**

1. 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 양의 물을 측정하십시오.  
Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
2. 계량컵/스푼을 사용하여 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오.  
Add listed amount of formula using measuring cups/spoons.
3. 잘 저어주십시오. Stir well.
4. 분유를 완전히 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에  
사용하십시오.  
Store the formula in a tightly covered container in the refrigerator and use  
within 24 hours of mixing.

물의 양 Amount of Water		분유의 양 (스푼에 꼭꼭 눌러서 담아 수평이 되도록 깎아서 계량) Amount of Formula (packed and level measurements)		만들어진 분유의 대략 온스 Approximate Ounces Made
___ 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces
___ 온스 ounces	+	___ 컵 cup + ___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons	=	___ 온스 ounces

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 분유를 데울 때 전자레인지 사용을 사용하지 마십시오. 대신 우유병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나, 우유병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 분유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 우유병에 남아 있는 분유는 수유 후 2 시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스

Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원(University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니니다.

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by [University of Michigan Health](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.





# \_\_\_\_\_을(를) 사용하여 모유를 보강하는 방법

How to fortify breast milk

using \_\_\_\_\_ (Korean)

## 설명서: Instructions:

- 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 모유의 양을 측정하십시오.  
Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
- 계량 스푼을 사용하여 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오.  
Add listed amount of formula using measuring spoons.
- 잘 섞어주십시오. Mix well
- 모유는 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에 사용하십시오.  
Store the breast milk in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

온스당 칼로리 Calories per Ounce	모유의 양 Amount of Breast Milk		분유의 양 (스푼에 꼭꼭 누르지 말고 수북히 담아서수평이 되도록 깎아서 계량) Amount of Formula (unpacked and level measurements)
□ 22	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 24	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 26	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 28	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 30	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 모유를 데울 때 전자레인지 사용하지 마십시오. 대신 병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나 병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 혼합 모유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 병에 남아 있는 모유는 수유 후 2 시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스 Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원(University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니다.

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by [University of Michigan Health](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.

\_\_\_\_\_을(를) 사용하여  
 모유를 보강하는 방법

How to fortify breast milk

using \_\_\_\_\_ (Korean)

**설명서: Instructions:**

- 투명한 액체 계량컵을 사용하여 적혀있는 모유의 양을 측정하십시오.  
 Measure out listed amount of water using a clear liquid measuring cup.
- 계량 스푼을 사용하여 적혀있는 양의 분유를 추가하십시오.  
 Add listed amount of formula using measuring spoons.
- 잘 섞어주십시오
- 모유는 밀폐된 용기에 담아 냉장고에 보관하고, 혼합 후 24 시간 이내에 사용하십시오.  
 Store the breast milk in a tightly covered container in the refrigerator and use within 24 hours of mixing.

온스당 칼로리 Calories per Ounce	모유의 양 Amount of Breast Milk		분유의 양 (스푼에 꼭꼭 눌러서 담아 수평이 되도록 깎아서 계량) Amount of Formula (packed and level measurements)
□ 22	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 24	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 26	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 28	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons
□ 30	4 온스 ounces	+	___ 큰 스푼 tablespoons + ___ 티스푼 teaspoons

## 유념해야 할 중요한 사항: Important things to remember:

- 모유를 데울 때 전자레인지 사용을 하지 마십시오. 대신 병 위에 따뜻한 물을 흐르게 하거나 병을 따뜻한 물이 담긴 용기에 넣어서 혼합 모유병을 데우십시오.

Never use a microwave to heat the formula. Instead, heat the mixed formula in a bottle by running warm water over the bottle or by placing the bottle in a container of warm water.

- 병에 남아 있는 모유는 수유 후 2 시간 이내에 버리십시오. 다음 수유 때 사용하지 마십시오.

Throw away any formula left in the bottle within 2 hours after a feeding. Do not use for next feeding.

이 문서의 레시피/정보에 대한 질문이나 우려 사항은 다음 연락처로 문의하십시오.

Questions or concerns about the recipe/information on this sheet, contact:

이름: \_\_\_\_\_ 전화번호: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by University of Michigan (U-M) Health for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by U-M Health and for which U-M Health does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 대학 병원 (University of Michigan Health) 통역 서비스 Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

미시간 대학 병원(University of Michigan Health) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니니다.

최종 수정 2023/7/10

Patient Education by [University of Michigan Health](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 7/10/2023

This translation was made possible by Interpreter Services Translation Grant FY 24.