

위장관 운동 검사 시, 무엇을 예상할 수 있습니까?

What can I expect from a GI Motility Study?

이 검사는 호흡을 방해하지 않는 가느다란 관을 삼키면서 진행됩니다. 이 관은 위와 소장의 운동 (움직임)을 관찰합니다. 몇 시간 동안 운동을 관찰한 후, 상부 위장관의 운동을 검사하기 위해 시험식이나 약물을 투여합니다. 이 검사는 약 열한 (11)시간이 소요됩니다. The test will involve the swallowing of a small tube which will not interfere with your breathing. This tube will monitor the motility (movement) of your stomach and small intestine. After monitoring the motility for a few hours, a test meal or medication will be administered to examine the motility in the upper gastrointestinal (GI) tract. This test will take approximately eleven (11) hours.

위장관 운동 검사는 어떻게 준비합니까?

How do I prepare for a GI Motility Study?

3 일 전: 3 days before:

다음 약은 복용하지 마십시오.

Do not take the following medications:

- 운동성: Reglan, Cisapride, Erythromycin, Domperidone
Motility: Reglan, Cisapride, Erythromycin, Domperidone
- 항오심제: Compazine, Tigan, Torcecan, Zofran
Anti-Nausea: Compazine, Tigan, Torcecan, Zofran
- 마약성/진통제: Codeine, Vicodin, Percocet, Norco, Darvon, 등
Narcotic/Pain: Codeine, Vicodin, Percocet, Norco, Darvon, etc.
- 진경제: Bentyl, Levsin, Donnatal
Anti-Spasmodic: Bentyl, Levsin, Donnatal

하루 전: 1 day before:

- 전날 밤 10 시 이후에는 금식을 합니다.

Nothing by mouth after 10:00pm the night before.

- 금연을 합니다

No Smoking

검사 당일: Day of your test:

- 편안한 옷을 입고 오십시오. Wear comfortable clothes.

- 당뇨병이 있는 경우, 복용하고 있는 Lente, NPH 또는 Novolin 70/30 인슐린을 평소 용량의 절반만 복용하고, 검사 당일 아침에는 정기적으로 복용하는 약은 **드시지 마십시오.** If you have diabetes please take half of your usual Lente, NPH, or Novolin 70/30 insulin dose and do **not** take any regular on the morning of your test.

- 심장, 혈압, 호흡 또는 발작약과 같이 반드시 복용해야 하는 필수적인 약은, 검사 당일 아침에 몇 모금 정도의 소량의 물과 함께 복용하십시오. 의사 또는 간호사가 달리 조언하지 않는 한, 처방받지 않고 구입한 약이나 보충제를 포함한 필수적이지 아닌 약은 복용하지 마십시오. Critical medicines, such as those for your heart, blood pressure, breathing, or seizures, should be taken with sips of water on the morning of the test. Noncritical medicines, including over-the-counter medicines and supplements should not be taken, unless, your doctor or nurse has advised you otherwise.

검사 약속을 지킬 수 없는 경우에는 의료 시술 병동 (734) 936-9250 또는 무료 전화 (877) 758-2626 으로 전화하십시오.

If you are unable to keep your appointment, please call the Medical Procedures Unit at (734) 936-9250 or toll-free at (877) 758-2626.

책임의 한계 및 법적 고지: 본 문서는 귀하와 동일한 상태의 전형적인 환자를 위해 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 만든 정보 및/혹은 교육용 자료입니다. 여기에는 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 직접 작성하지 않은 온라인 내용에 관한 링크가 포함되어 있을 수 있는데, 이에 대한 책임은 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 에서 지지 않습니다. 귀하의 경험이 전형적인 환자의 경험과 다를 수 있으므로, 본 문서가 담당 의료진의 의학적인 자문을 대체하지는 않습니다. 본 문서나 건강 상태 혹은 치료 계획에 관한 문의가 있다면, 반드시 담당 의료진과 상담하십시오.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.

번역: 미시간 메디신 (Michigan Medicine) 통역 서비스

Translation: Michigan Medicine Interpreter Services

[미시간 메디신 \(Michigan Medicine\)](#) 의 환자 교육은 [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#) 에 따라 인가 받았습니다.

최종 수정 2019/01

Patient Education by [Michigan Medicine](#) is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License](#). Last Revised 01/2019